

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Порцилис PCV против цирковирусной
инфекции свиней инактивированной эмульгированной.

(Организация-разработчик "Intervet International B.V.", Нидерланды).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Порцилис PCV (Porcilis® PCV).

Международное непатентованное наименование: вакцина против цирковирусной инфекции свиней инактивированная эмульгированная.

2. Лекарственная форма - эмульсия для инъекций. Вакцина изготовлена из протективного антигена ORF2 цирковируса второго типа, с добавлением в качестве адъювантов – 25 мг dl- α -токоферол ацетата и 346 мг жидкого парафина, эмульгатора – 26,7 мг полисорбата 80, пеногасителя – 16,7 мкг симетикона и воды для инъекций до 2,0 мл.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета.

При хранении допускается выпадение осадка, который легко ресуспендируется при взбалтывании.

Вакцина расфасована по 50 мл (25 доз), 100 мл (50 доз) или 200 мл (100 доз) в стеклянные или пластиковые флаконы, соответствующей вместимости, герметично закупоренные под вакуумом резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упаковывают в индивидуальные картонные коробки, обеспечивающие их целостность. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины на русском языке.

Срок годности вакцины 36 месяцев с даты выпуска, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

По истечении срока годности вакцина к применению непригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке, в сухом темном месте, при температуре от 2 до 8°C.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности закупки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, подвергшееся замораживанию, а также остатки вакцины, не

использованные в течение 8 часов после вскрытия флаконов, бракуют, обезвреживают кипячением в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина Порцилис PCV вызывает формирование иммунного ответа к цирковирусу свиней второго типа через 2-3 недели после однократного введения продолжительностью 6 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактики цирковирусной инфекции свиней у поросят в неблагополучных и угрожаемых по данной болезни хозяйствах.

9. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных. Противопоказанием к вакцинации является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Вакцинации подлежат поросята, начиная с 3-недельного возраста.

Вакцину вводят внутримышечно однократно в дозе 2,0 мл в область шеи за ухом с помощью полуавтоматических инъекторов или шприцев, используя для каждого животного отдельную стерильную иглу. Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70% этиловым спиртом.

При проведении вакцинации соблюдают общепринятые правила асептики и антисептики.

Перед применением флаконы с вакциной выдерживают 3-4 часа при температуре 20-25° С. Запрещается подогревать вакцину на водяной бане и на отопительных приборах. До начала и во время проведения иммунизации флаконы с вакциной периодически встряхивают для поддержания однородности эмульсии.

11. Симптомы цирковирусной инфекции свиней или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлены.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичном и последующем введениях не выявлены.

13. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее. Следует избегать нарушения срока вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики цирковирусной инфекции свиней.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией у некоторых животных может наблюдаться слабая гипертермия (до 40,5°С), угнетение, снижение аппетита, которые исчезают в течение нескольких дней. Также возможно образование в месте инъекции незначительной припухлости, полностью исчезающей в течение 14 суток.

15. Запрещается использовать вакцину против цирковирусной инфекции свиней совместно с другими иммунобиологическими препаратами, а также прививать животных другими вакцинами в течение 5 суток до и после очередной иммунизации Порцилис PCV.

16. Продукты убоя от вакцинированных свиней используют без ограничения независимо от срока вакцинации.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При проведении вакцинации необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые сапоги и перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении вакцины человеку, место введения необходимо обработать 70% этиловым спиртом, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: «Intervet International B.V.», Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция разработана компанией «Intervet International B.V.» (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands) совместно с ООО «Интервет» (143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Промышленная д.81/1).

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению вакцины Порцилис PCV против цирковирусной инфекции свиней утвержденная Россельхознадзором 21.06.2012 г.