

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мультивита для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

(организация – разработчик: «INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. (INVESA)», Испания)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мультивит (Multivit).

Международное непатентованное наименование: витамины А, Д₃, Е, К, С, В₂, В₆, В₁, РР, декспантенол.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения

В 1 мл в качестве действующих веществ содержится: витамина А – 10 000 МЕ, витамина Д₃ – 2000 МЕ, витамина Е – 2 мг, витамина В₁ – 4,0 мг, витамина В₂ – 600 мкг, витамина В₆ – 600 мкг, витамин РР – 6 мг, декспантенол – 2 мг, витамина С – 20 мг, витамина К₃ – 2 мг, а в качестве вспомогательных веществ: эмульсоген ЕЛ 360, нипагин – 3 мг, пропиленгликоль – 150 мкл, вода очищенная – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой опалесцирующий раствор желто-оранжевого цвета.

3. Выпускают Мультивит расфасованным по 100 мл и 1 л в герметично закрытых полимерных флаконах, а также по 5 и 25 л в герметично закрытых полимерных канистрах.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. Запрещается применять Мультивит по истечении срока годности.

5. Мультивит следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мультивит содержит водо- и жирорастворимые витамины и компенсирует дефицит этих биологически активных веществ в организме животных при

гиповитаминозах вызванных несбалансированным кормлением, стрессами, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при высокой продуктивности животных.

Мультивит по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007.

III. Порядок применения

8. Мультивит применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, при несбалансированном кормлении, в период высокой продуктивности, интенсивного роста, при стрессах, а также как вспомогательное средство при лечении инфекционных болезней и дегельминтизации животных.

9. Противопоказаний к применению лекарственного препарата не выявлено.

10. Применяют сельскохозяйственным животным и птице с водой для поения или с кормом групповым (через системы автопоения) или индивидуальным способом в дозах 0,5 мл/л воды для поения или 1 мл на 1 кг корма в течение 5-7 дней. При необходимости курс повторяют через 1-2 месяца.

11. Симптомы передозировки у животных могут проявляться угнетением функций организма и гипервитаминозы.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении Мультивита в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственной птицы, как правило, не наблюдается.

15. Лекарственный препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

16. Продукцию от животноводства и птицеводства после применения Мультивита можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мультивитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые пакеты из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. (INVESA), Испания. Место производства: C/Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain.

Инструкция разработана компанией INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. (INVESA) C/Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С Утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором от 22.05.2008 г.