

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Солвимина Селена
для профилактики и лечения гиповитаминозов, а также заболеваний, вызванных
недостатком селена, у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-разработчик «KRKA d.d., Novo mesto», Словения)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Солвимин Селен (Solvimin® Selen).
Международное непатентованное наименование: витамин А+ витамин В₁+ витамин В₂+ витамин В₆+ витамин В₁₂+ витамин С+ витамин D₃+ витамин Е+ витамин К₃+ кальция пантотенат+ никотинамид+ селен.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Солвимин Селен содержит в 100 г действующих веществ: витамина А - 2000000 МЕ; витамина В₁ - 150 мг; витамина В₂ - 250 мг; витамина В₆ - 200 мг; витамина В₁₂ - 1 мг; витамина С - 2000 мг; витамина D₃ - 100000 МЕ; витамина Е - 550 мг; витамина К₃ - 200 мг; кальция пантотената - 650 мг; никотинамида - 1800 мг; и селена - 3 мг, а также вспомогательные вещества – безводный аэросил 0,3%, ароматизатор яблоко-анис 0,16%, сорбитол до 100%. По внешнему виду представляет собой светло-оранжевый порошок со специфическим запахом

3. Солвимин Селен выпускают, расфасованным в пластмассовые контейнеры.

4. Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 18 месяцев с даты производства. Срок годности препарата после вскрытия упаковки 28 дней.

Запрещается использовать лекарственное средство после истечения срока годности.

5. Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

5. Солвимин Селен обладает комплексным действием, компенсирует недостаточность витаминов и селена при гипо и авитаминозах и недостатке селена в рационе животных. Витамины участвуют в метаболизме в качестве катализаторов и необходимы для обеспечения нормальной функции организма. Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Его применение способствует повышению неспецифической резистентности организма животных к различным воздействиям окружающей среды.

Солвимин Селен по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

III. Порядок применения

8. Солвимин Селен применяют для профилактики (в период стрессов, вакцинации, при несбалансированности кормления, высокой продуктивности) и лечения гиповитаминозов и заболеваний, вызываемых недостатком селена в кормах, а также в качестве вспомогательного средства в терапии гельминтозов, бактериальных и вирусных заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов и домашней птицы.

9. Противопоказаний для применения лекарственного препарата не установлено.

10. Солвими́н Селен применяют с лечебной целью в течение 7 суток в следующих дозах:

- домашней птице – 25-50 г на 100 л питьевой воды;

- телятам, жеребятam, свиньям - 2-4 г на голову, поросятам, овцам, козам - 5-10 г на 10 голов, козлятам и ягнятам – 2 - 4 г на 10 голов, лошадям и крупному рогатому скоту – 4-8 г на животное, кроликам – 1-2 г на 10 животных.

Необходимое количество препарата растворяется в питьевой воде, молоке или заменителе молока. Каждый день готовится свежий раствор.

С профилактической целью Солвими́н Селен применяют в течение 3-5 суток в лечебных дозах.

При необходимости курс можно повторять каждые 2 месяца.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. В случае не соблюдения установленного срока повторного применения препарата следует применить его в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений при соблюдении указанной дозировки и условий применения не установлено.

15. Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлено.

16. Продукцию от животных и птиц во время и после применения Солвими́на Селена можно использовать в пищевых целях без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Солвими́ном Селеном необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Солвими́ном Селеном. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Контейнеры из-под лекарственного препарата запрещено использовать для бытовых целей. Пустые контейнеры помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «KRKA d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Адрес места производства: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Адрес Представительства «KRKA d.d., Novo mesto»: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13/43, 6 этаж.

Инструкция разработана «KRKA d.d., Novo mesto», Словения

Рекомендовано к регистрации в РФ ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

С утверждением настоящей инструкции по применению Солвими́на Селена, считать утратившей силу инструкцию по применению, утвержденную Россельхознадзором 21.04.2011 г.