

	Инструкция по применению Мази Левомеколь для лечения гнойных ран, трофических язв, фурункулов и других кожных заболеваний. Регистрационный номер РК-ВП-4-2848-14 от 12.11.2014 г.
--	---

ИНСТРУКЦИЯ по применению Мази Левомеколь для лечения гнойных ран, трофических язв, фурункулов и других кожных заболеваний

(организация-разработчик ООО «БиоФармГарант», 600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьевец, ул. Станционная, д. 45)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь Левомеколь (Unguentum Laevomekolum).
Международное непатентованное наименование: хлорамфеникол, метилурацил.
2. Лекарственная форма – мазь для наружного применения.
Мазь Левомеколь содержит в 100 г в качестве действующих веществ левомецетин (хлорамфеникол) - 0,75 г и метилурацил - 4 г, а в качестве вспомогательных веществ – вазелин и масло подсолнечное или смесь полиэтиленоксидов 1500 и 400.
3. По внешнему виду Мазь Левомеколь представляет собой однородную густую массу от белого до слегка желтоватого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.
Запрещается использовать мазь Левомеколь после окончания ее срока годности.
4. Выпускают Мазь Левомеколь расфасованной по 10, 100, 150, 200, 250, 500 г и 1,0 кг в полимерных банках, укупоренных крышками с контролем первого вскрытия. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят Мазь Левомеколь в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 20°С.
6. Мазь Левомеколь следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мазь Левомеколь относится к фармакологической группе комбинированных противовоспалительных и противомикробных препаратов для местного применения.
10. Легко проникает вглубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулируя процессы регенерации. При гнойных и некротических процессах тканей антибактериальное действие сохраняется.
Входящий в состав левомецетин эффективен в отношении многих грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков и др.), кишечной и гемофильной палочки, сальмонелл, шигелл и др., а также некоторых крупных вирусов. Эффективен в отношении штаммов микроорганизмов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших. Устойчивость микроорганизмов к левомецетину развивается относительно медленно.
Регенерирующее действие Мази Левомеколь обусловлено метилурацилом, который, легко проникая вглубь тканей, активирует процесс синтеза новых клеток. Метилурацил активирует процессы устранения избытка жидкости из воспаленных тканей и снимает отечность. Оказывает стимулирующее влияние на обменные процессы на клеточном уровне, что ускоряет заживление ран и восстановление тканей. Активирует выработку интерферона.
Мазь Левомеколь по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76)

III. Порядок применения

11. Мазь Левомеколь предназначена для лечения гнойных ран, трофических язв, фурункулов и других кожных заболеваний, обусловленных смешанной микрофлорой. Применяется для лечения ожогов 2 и 3 степеней. Средство используется с целью прекращения активного воспалительного процесса, устранения патогенных микробов и очищения раны от гнойного содержимого и некротических масс, а также снятия отека.

12. Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости и гиперчувствительности к компонентам препарата.

13. Препарат применяют местно. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану.

В гнойные полости допускается введение препарата, предварительно подогретого до 35-36°C, через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. Смену повязки следует проводить ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При необходимости мазевую повязку можно менять чаще.

14. Мазь Левомеколь является малореактогенным препаратом. Передозировка препарата маловероятна.

15. Особенности реакций организма при применении препарата не установлено.

16. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

17. При длительном применении у животного на месте нанесения препарата возможны раздражения кожи. В отдельных случаях возможны аллергические проявления (сыпь, зуд, крапивница).

18. Информация по взаимодействию Мази Левомеколь в сочетании с другими лекарственными средствами для наружного применения отсутствует.

19. Побочных явлений и осложнений при применении Мази Левомеколь в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

20. Продукты животноводства во время и после применения Мази Левомеколь используются без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мазью Левомеколь следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью Левомеколь.

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного назначения

ООО «БиоФармГарант»
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьево,
ул. Станционная, д. 45

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «БиоФармГарант»,
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьево,
ул. Станционная, д. 45

Номер регистрационного удостоверения _____ПК-ВП-4-2848-14_____