

Инструкция по применению ветеринарного препарата «Ихглюковит»

1 Общие сведения

1.1 Ихглюковит (Ihglucovitum).

Далее препарат.

1.2 Препарат представляет собой стерильную однородную маслянистую жидкость от коричневого до черного цвета.

1.3 В 1 см³ препарата содержится 35 мг ихтиола, 200 мг глюкозы, 20 мг аскорбиновой кислоты, вспомогательные вещества (спирт изопропиловый) и растворитель (вода).

1.4 Препарат упаковывают в стеклянные флаконы по 50, 100, 200, 250, 400, 450 и 500 см³.

1.5 Препарат хранят в упаковке предприятия-производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.6 Срок годности – один год от даты производства при соблюдении условий хранения. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

2 Фармакологические свойства

2.1 Комплексный препарат, обладающий антисептическим, противовоспалительным действием, улучшает обмен веществ и ускоряет регенерацию тканей. Действие препарата на организм определяется воздействием компонентов.

2.2 Ихтиол обладает антисептическим, противовоспалительным, болеутоляющим и кровоостанавливающим действиями.

2.3 Глюкоза повышает процессы обмена веществ, улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает сократительную деятельность сердечной мышцы, расширяет сосуды, увеличивает диурез.

2.4 Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных реакциях, существенно повышает активность ретикулоэндотелиальной системы и фагоцитарную активность.

2.5 Компоненты препарата (глюкоза и аскорбиновая кислота) включаются в клеточный метаболизм, а ихтиол - выводится с мочой и фекалиями.

3 Порядок применения

3.1 Препарат применяют коровам с лечебной или профилактической целью при эндометритах и субинволюции матки.

3.2 Препарат вводят в дозе 10 см³ на 100 кг массы тела животного с помощью шприца Жанэ, соединенного резиновой трубкой (длиной 70-100 см) с иглой Баброва (10-12 см), паравагинально (в передне-верхний угол прямокишечной ямки справа или слева от анального отверстия). Одномоментальным толчком руки иглу вводят под углом 40-45° к поверхности ямки на глубину 5-7 см в направлении мечевидного отростка грудной кости.

Предварительно место инъекции обрабатывается одним из антисептических средств.

3.3 С **профилактической** целью препарат вводят новотельным коровам в день отела (или не позднее второго дня после отела) двукратно с интервалов 48 часов.

3.4 С **лечебной** целью – вводят через каждые 48 часов до клинического выздоровления животного.

3.5 Противопоказаний, побочных явлений и осложнений после применения препарата не установлено. На месте инъекции может возникать безболезненная припухлость, которая исчезает через 3-4 дня.

3.6 Применение препарата не исключает использование других симптоматических средств терапии.

3.7 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 9 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.

Инструкция по применению препарата подготовлена сотрудниками РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского" (П.А. Красочко, Д.В. Курлович, Ю.В. Ломако), доцентом кафедры токсикологии и фармакологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» Петровым В.В., начальником отдела развития ООО «Белэкотехника» Пиотухом А.С.

